


一味大黃氣死名醫

〈下瘀血湯方〉中破癥化瘀腫瘤的藥，不是〈蟪蟲〉更不是〈桃仁〉而是〈大黃〉

主講者：廖桂聲

中西醫師 廖桂聲中醫診所 www.lkscmc.com.tw

台北市立仁愛醫院兼任主治醫師



實際上惡性化相當罕見，而診斷必須符合三要件：

卵巢必須有子宮內膜異位症。

必須是腺角化癌。

發現由良性變惡性的轉化過程。

子宮內膜異位腫瘤，轉變的惡性癌，大多為腺角化癌，占全部卵巢癌的四分之



(金匱要略二十二-05) 師曰:產婦.腹痛.法當以枳實芍藥散。

假令不愈者.此為腹中有乾血著臍下.宜下瘀血湯主之.亦主經水不利。

(下瘀血湯方)

大黃三兩 桃仁二十枚 蟪蟲熬.去足.二十枚。

右三味.末之.煉蜜.和為四圓.以酒一升.煎一圓.取八合.頓服之。

下瘀血湯



蟪蟲

(金匱要略二十二-05)
師曰:產婦.腹痛.法當以枳實芍藥散.
假令不愈者.此為腹中有乾血著臍下.宜下瘀
血湯主之.亦主經水不利.

(下瘀血湯方)

大黃 三兩 桃仁 二十枚 蟪蟲 熬.去足.二十枚.

右三味.末之.煉蜜.和為四圓.以酒一升.煎一
圓.取八合.頓服之.

註解：以前許多技藝的傳承都是採用師徒制，而與生命相關的醫學亦然也，故有〈師曰〉或者〈問曰〉的對答詞句，〈溫經湯〉與〈腎氣圓〉等等的條文中，都先有〈問曰〉的問對之詞再有〈師曰〉的答覆之詞，一如師生的一般對話，學生先請教問題，之後，老師再回答學生的問題，故本條文已非完整之文，顯然是疏漏或添加之文，故只有〈師曰〉之詞而無〈問曰〉之詞。

產婦腹痛的原因多而複雜，除了產褥熱，急慢性胃腸炎，泌尿系統的感染之外，一般還是以子宮在排除惡露時，引起子宮肌肉過度收縮，所造成的腹痛證狀佔較多數。

〈枳實芍藥散〉在〈下瘀血湯方〉未出現之前或許已流傳許久，但經過了許多的臨床驗證及經驗的累積，前賢已深知產婦腹痛不應給予〈枳實芍藥散〉，否則可能無效或另生它變，故曰：〈法當以枳實芍藥散〉，而〈法當以枳實芍藥散〉之〈法當〉二字之意為〈本應該給之〉，但事實上卻不可以給之，故謂之〈法當〉也。

〈假令不愈者〉雖是假設的語詞，乃前賢臨床實證用了〈枳實芍藥散〉治療〈產婦，腹痛〉，其治療結果與事實差異太大或大相逕庭甚至背道而馳，故才語帶含蓄的說：〈假令不愈者〉。前賢具敏銳的觀察力，發現了產婦在排除惡露時有血塊導致腹痛，故曰：〈腹中有乾血著臍下〉。而〈腹中有乾血著臍下〉的〈乾血〉乃指子宮內膜排

出的凝固的血塊，而〈乾血著臍下〉之意並非〈乾血〉附著於肚臍以下，其意乃指〈乾血〉是由肚臍以下的子宮所排出。

前賢在產婦腹痛的臨床驗證上，應用了〈枳實芍藥散〉結果是未能如願，故又創立了〈下瘀血湯方〉來治療〈產婦腹痛〉，在臨床驗證上誠有效也，實乃先賢所留下的寶貴資產，嘉惠後世亦實良多。

〈下瘀血湯方〉中有〈大黃，桃仁，蟪蟲〉三味藥，〈大黃〉有促進子宮收縮的作用，以加速排除惡露且有消炎的作用以幫助子宮快速的修護，更可促進乳汁的分泌，以利母親與嬰兒的互動式健康，誠產後面面俱到的最佳之良藥。〈桃仁〉在古代亦含有趨吉避凶的心理作用，又如〈傷寒論〉中的〈桃花湯方〉中雖無〈桃仁〉亦無〈桃花〉卻用來治療〈便膿血〉，其意亦以〈桃花〉之名藉以趨吉避凶，以期藥到病除。〈桃仁〉含有豐富的油脂成份與〈大黃〉合用雖有些微的加分的用，但可有可無最好是捨之不用，以免多此一舉甚至是畫蛇添足而礙手礙腳。

此說何以見得？我們來檢視本條文的煮服法即可一目了然而瞭若指掌。煮服法：〈右三味.末之.煉蜜.和為四圓.以酒一升.煎一圓.取八合.頓服之〉，文中明載〈右三味.末之.煉蜜.和為四圓〉則每一圓含〈大黃〉的劑量大約八錢，含〈桃仁〉的劑量則為五枚，含〈蟪蟲〉的劑量則為五枚，所以，依比例原則而言〈桃仁〉、〈蟪蟲

＞與＜大黃＞的劑量完全不成比例，故知＜桃仁＞、＜蟪蟲＞可能為後人胡亂添加而非原汁原味的素樸原文。

其煮服法又有一特別之處就是＜若以酒一升.煎一圓.取八合.頓服之＞，若＜大黃＞以酒煎煮可減緩子宮的過度收縮所造成的劇烈疼痛，且酒又具有麻醉作用亦可緩解疼痛的感覺，更可提升＜大黃＞的＜消炎、修復、強化＞組織的功能，可謂是一舉數得。

＜蟪蟲＞俗稱＜地驚蟲＞或＜土驚蟲＞，前賢誤認為其有如同蚊子或水蛭等的吸血功能，就以為＜蟪蟲＞有破癥化瘀的神效，此說只知其然而不知其所以然也。臨床上＜蟪蟲＞生用時，其抗凝血的成份必將在人體的胃酸受到破壞，而熟用煮成湯方時，其抗凝血的蛋白質成份亦會因加熱而受到破壞，故＜下瘀血湯方＞中破癥化瘀的藥，不是＜蟪蟲＞更不是＜桃仁＞而是＜大黃＞，才是正確。

因前賢誤以為＜蟪蟲＞有破癥化瘀的功效，故後世醫家每每喜以蟲類作為藥方的藥引子，以增加其神秘感，此舉自愚且愚人，反而把真相切割成阡陌縱橫，四處溝渠，片片斷崖殘壁以致悽慘枉死的比死裡逃生的多，若是這樣大可不必也！故愛因斯坦：＜任何有智慧的笨蛋，都能把事情搞的更大更複雜也更激烈，但往相反方向走則需要更大的天分和很多的勇氣＞。

所以，理性與矛盾的糾纏絕對是無法迴避，但終究是必須跨越過的

障礙與藩籬，若無法跨越也就難免更加不堪且愈晚處理帶來的傷害只會更大，這一代再也不能如此不負責任，再也不能自陷集體思維的盲點而不自知，否則為識者所不恥。

女子月經過期不來或月經來時經量太少，皆可曰：〈經水不利〉，〈下瘀血湯〉雖有其效，但其真正有效之藥唯〈大黃〉而已，其方中的〈桃仁，蟪蟲〉也是沉重的包袱與負擔，只會讓〈大黃〉的光亮蒙塵，故棄之不用不足為惜反而是一種明智之舉，因此，〈〈新漢醫學〉〉運用〈科學精製漢藥〉的〈大黃粉、甘草粉、地黃粉、黃連粉〉與〈知母萃取精華液〉的精銳之師來對治各種〈經水不利〉必可無往不利而水到渠成，所以精緻簡捷的用藥才真的可以一針見血遠勝過亂槍打鳥的華而不實，更是〈簡單就是力量〉的最佳寫照。

師曰：產婦：腹痛。法當以枳實芍藥散。假令不愈者：此為腹中有乾血著臍下。宜下瘀血湯主之。亦主經水不利。

證狀	師曰：產婦。腹痛。	備註	以前許多技藝的傳承，都是採用師徒制，而與生命相關的醫學，亦然也。故有師曰或者問曰的詞句。溫經湯與腎氣圓等等的條文中，都先有問曰之詞，再有師曰之詞。一如師生的一般對話，學生先問問題，之後，老師再回答學生的問題，故本條文已非完整之文，顯然是疏漏或添加之文，故只有師曰之詞，而無問曰之詞也。 產婦腹痛的原因多而複雜，除了產褥熱，急慢性胃腸炎，泌尿系統的感染之外，一般還是以子宮在排除惡露時，引起子宮肌肉過度收縮，所造成的腹痛證狀，佔較多數也。
處方	法當以枳實芍藥散。	➡	枳實芍藥散，在下瘀血湯方，未出現之前，或許已流傳許久，但經過了許多的臨床驗證及經驗的累積，前賢已深知，產婦腹痛，不應給予枳實芍藥散，否則可能無效，或另生它變，故曰：法當以枳實芍藥散，而法當以枳實芍藥散之法當二字之意，為本應該給之，但事實上卻不可以給之，故謂之法當也。
預候	假令不愈者。	➡	假令不愈者，雖是假設的語詞，乃前賢臨床實證，用了枳實芍藥散，治療產婦，腹痛，其治療結果與事實差異太大，故才語帶含蓄的說：假令不愈者。
病因	此為腹中有乾血著臍下。	➡	前賢具敏銳的觀察力，發現了產婦在排除惡露時有血塊，故導致腹痛，腹中有乾血著臍下的乾血，乃指子宮內膜排出的凝固的血塊，而乾血著臍下之意，非乾血附著於肚臍以下，其意乃指，乾血是由肚臍以下的子宮所排出也。
處方	宜下瘀血湯主之。	➡	前賢在產婦腹痛的臨床驗證上，應用了枳實芍藥散，結果是未能如願，故又創立了「下瘀血湯」方，來治療產婦腹痛，在臨床驗證上，誠有效也，實乃先賢所留下的寶貴資產，嘉惠後世，亦實良多也。 下瘀血湯方中，有大黃，桃仁，蟅蟲三味藥也。大黃有促進子宮收縮的作用，以加速排除惡露且有消炎的作用，以幫助子宮快速的修護，更可促進乳汁的分泌，以利母親與嬰兒的健康，誠產後之良藥也。而桃仁含有豐富的油脂成份，與大黃合用，更有加成的作用也，且桃仁在古代，亦有趨吉避凶的心理作用也。如傷寒論中的桃花湯方中，雖無桃仁亦無桃花，卻用來治療便膿血，其意亦以桃花之名，以趨吉避凶，以期藥到病除也。 蟅蟲俗稱地蠃蟲或土蠃蟲也。前賢皆因其有如同蚊子或水蛭等的吸血功能，就以為蟅蟲有破瘀化癥的神效也，此說只知其然而不知其所以然也。臨床上蟅蟲生用時，其抗凝血的成份，必將在人體的胃酸受到破壞，而熟用煮成湯方時，其抗凝血的蛋白質成份，亦會因加熱而受到破壞，故下瘀血湯方中，破瘀化癥的藥，不是蟅蟲，更不是桃仁，而是大黃，才是正確也。 因前賢誤以為蟅蟲有破瘀化癥的功效，故後世醫家，每每喜以蟲類作為藥方的藥引子，以增加其神秘感也。此舉，自愚且愚人，宜大可不必要也。
之兼證治	亦主經水不利。	➡	女子月經過期不來或月經來時經量太少，皆可曰：經水不利也。下瘀血湯雖有其效，但若將方中之蟅蟲換成甘草，則藥效仍然俱足且藥味更加美味，而容易入口也。

攻下藥

本類藥具有較強的瀉下作用，性味大多苦寒，既能通便，又能瀉火，主要適用於實熱積滯，燥屎堅結，大便秘結者。常配行氣、清熱藥以加強瀉下清熱作用。部分藥通過配伍溫裏藥，也可用於寒積便秘。

攻下藥的清熱瀉火作用，還可用於外感熱病所致的高熱神昏、譫語發狂；或火熱上炎所致的頭痛、目赤、咽痛、牙齦腫痛、吐血、衄血等症。不論有無便秘，均可取其苦寒泄降之力以清除實熱，導熱下行，起到「釜底抽薪」的效果。

目前，中西醫結合治療多種急腹症，根據「六腑以通為用」、「通則不痛」的原理，以攻下藥主，適當配伍清熱解毒、活血化癥藥物，取得了較好的效果。

功效	主治	性味	功用	主治	禁忌	性狀/炮製
大黃^B 大泄血分溼熱，下有形積滯。						
<p>瀉下攻積、瀉火、清熱解毒、活血祛瘀、清濕熱、消炎、利水、利膽藥。瀉火通便，破除積滯，行瘀解毒。瀉下攻積，清熱瀉火，解毒，活血祛瘀。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 積滯實證，熱積便秘，高熱不退，譫語發狂。 2. 實火頭痛、目赤、咽痛、口瘡。 3. 熱毒瘡瘍、腸癰等。 4. 血瘀經閉、產後惡露不下。 5. 跌打損傷、瘀血作痛。 6. 燒傷燙傷。 7. 濕熱黃疸、急性傳染性肝炎。 8. 熱瀉、急性腸炎，細菌性痢疾。 9. 熱性出血(如痔瘡出血)。 10. 膽管結石。 11. 水腫。 12. 淋證 	<p>大苦大寒，入足太陰、手足陽明厥陰血分(脾、胃、大腸)。</p>	<p>● 其性浮而不沉，其用走而不守，若酒浸 → 亦能引至高之分，用以蕩滌腸胃，下燥結而除熱，行水除痰，蝕消腫，能推陳致新。</p>	<p>● 傷寒時疾，發熱譫語，溫熱瘴瘧，下痢赤白，腹痛裏急，黃疸水腫，癥瘕積聚，留飲宿食，心腹痞滿，二便不通，吐血衄血，血閉血枯，損傷積血，一切實熱，血中伏火。</p>	<p>傷元氣而耗陰血。病在氣分、胃虛血弱人禁用。</p>	<p>川產錦紋者良。有酒浸，生熟不同，生用更峻。</p>

千百年來，一般人因其腹瀉的作用，而把大黃的藥性歸類為冷(寒)藥，並且把胃腸炎的腹瀉現象，誤解為因冷(寒)因，而引起的冷(寒)證(指腹瀉的現象)，實大大的曲解大黃功效中的瀉下作用。大黃的瀉下作用，非因其性味冷也，而是含有導致胃腸蠕動的物質，若是劑量控制得宜，大黃不僅不會拉肚子，反而是非常好的消炎物質，甚至於是很好的抗癌物質。

血漿血球與血小板的家族，川流不息在脈中逡巡，須臾不輟，應隨證情，治標治本，從活血化瘀到蕩滌腫痛，灌溉五臟六腑，濡養四肢百骸。唯大黃其功妙也，端賴使用者，出神入化之手法，大黃號稱『將軍』一味藥名，不為而過。