



常用抗癲癇藥物及副作用

主講者：廖桂聲

中西醫師 廖桂聲中醫診所 www.lkscmc.com.tw



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Diphenylhydantoin Phenytoin
- 商品名Dilantin Aleviatin Hydantin
- 中文名
 - 癲能停、阿雷德彼阿慶片
- 副作用
 - 噁心、嘔吐、胃部灼熱感、食慾不振、複視、眼振、步履不穩（共濟失調）、齒齦肥大、多毛症、粗糙臉、手足徐動症、淋巴腺腫、畸胎、皮膚疹。
- 注意事項
 - 每年檢查一次血球數、保持口腔衛生



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Phenobarbital Phenobarbitone
- 商品名Luminal
- 中文名
 - 癲魯米那
- 副作用
 - 嗜睡、鎮靜、激動不安、反應遲鈍、精神機能降低、無力感、步履不穩（共濟失調）、皮膚疹、發燒
- 注意事項



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Primidone
- 商品名Mysoline
- 中文名
 - 邁蘇靈
- 副作用
 - 噁心、嘔吐、暈眩、嗜睡、鎮靜、行爲障礙、步履不穩（共濟失調）、頭痛、脫力感、精神不安、皮膚疹、發燒。
- 注意事項
 - 少量開始



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Carbamazepine
- 商品名Tegretol
- 中文名
 - 癲通
- 副作用
 - 嗜睡、胃不適、腹瀉、頭暈、頭重、步履不穩（共濟失調）、白血球缺乏症、再生不能性貧血、肝功能異常、心率不整、皮膚疹。
- 注意事項
 - 最初半年每月檢查一次肝功能（SGOT）及血球數，以後每四個月一次。



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Ethosuximide
- 商品名Zarontin Simatin Petnidan
- 中文名
- 副作用
 - 嗜睡、噁心、感覺異常、頭痛、眩暈、疲乏、腎功能障礙、白血球缺乏症、全血球缺乏症、精神病、紅斑性狼瘡、皮膚疹。
- 注意事項
 - 最初半年每月檢查一次血球數及驗尿，以後每四個月一次。



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Valproic Acid
- 商品名Depakine Depakene
- 中文名
 - 帝拔癲
- 副作用
 - 嗜睡、噁心、嘔吐、胃絞痛、腹瀉、血小板缺乏症、禿頭、體重增加、顫抖、肝功能障礙、肝炎、胰臟炎、畸胎、皮膚疹。
- 注意事項
 - 最初二月每兩週檢查一次血球數、肝功能（SGOT、SGPT），以後一年每月一次。



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Clonazepam
- 商品名Rivotril
- 中文名
 - 利福全
- 副作用
 - 嗜睡、頭重、噁心、眩暈、步履不穩（共濟失調）、反應遲鈍、各種反射功能減弱、疲勞感、皮膚疹。
- 注意事項



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Nitrazepam
- 商品名Mogadon
- 中文名
 - 眠確當
- 副作用
 - 同上
- 學名Diazepam
- 商品名Valium
- 中文名
 - 煩寧副
- 副作用
 - 同上



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Sulthiame
- 商品名Ospolot
- 中文名
- 副作用
 - 複視、感覺異常、皮膚疹。
- 注意事項



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Trimethadione
- 商品名Tridione Minoaleviatin
- 中文名
- 副作用
 - 嗜睡、畏光、噁心、胃之不快感、失眠、不安、再生不能性貧血、顆粒性白血球缺乏症、全血球缺乏症、腎病、視力障礙、呃逆、肌無力症、精神病、皮膚疹
- 注意事項
 - 每月檢查一次血球數及驗尿



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Mephobarbital
- 商品名Mebaral Prominal
- 中文名
- 副作用
 - 嗜睡、激動不安、皮膚疹。
- 注意事項



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Acetazolamide
- 商品名Diamox
- 中文名
- 副作用
- 手足異常感、嗜睡、食慾不振、精神不安、顆粒性白血球缺乏症、皮膚疹。
- 注意事項最初半年每月檢查一次血球數，以後半年一次。



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Chlorazepate dipotassium
- 商品名Diamox
- 中文名
- 副作用
 - 嗜睡、憂鬱。
- 注意事項



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名ACTH Corticotropon
- 商品名Cortrosyn
- 中文名
 - 腎上腺皮質激素
- 副作用
 - 月亮臉、青春痘、高血壓、糖尿病、消化性潰瘍、骨質疏鬆、激動不安。
- 注意事項
 - 常檢查血壓、血糖、大便潛血。



常用抗癲癇藥物及副作用

- 學名Corticosteroid
- 商品名Predonin Prednisone
Prednisolone
- 中文名
- 腎上腺皮質激素
- 副作用同上
- 注意事項同上



常用抗癲癇藥物及副作用

- 第一類的副作用與個人的特異體質有關—過敏反應
 - 部分發生在開始服藥的第二、三週，少數發生於其他時間。病人身上出現紅疹子（蕁麻疹、風疹），四肢、軀幹或臉上都可能發生，而且會癢，一旦出現這種過敏反應，應立即停藥並找醫師，改用另外的抗癲癇藥物，如果疹子出得很厲害，醫師會給予適當的治療；要是繼續服用此過敏的藥，可能會演變成更嚴重的反應，發生剝皮性皮膚炎，恐有致命之虞。



常用抗癲癇藥物及副作用

- 第二類的副作用與劑量有關，即引起昏睡、嗜睡的作用。
 - 抗癲癇藥物只要大量服，大多可能引起昏睡，只是有些比較容易發生而已，其中**Mysoline**及**Luminal**是最會引起嗜睡的。大部分的藥在減量後可使嗜睡現象減輕或消失；有些嗜睡消失後再慢慢加量；或一開始由小量逐漸增加，就不會發生嗜睡現象；有些則減到不嗜睡的劑量時，無法控制發作，則應考慮忍受輕微的副作用或改服他種藥品。大量中毒的話，則可能使病人昏迷不醒，需要緊急送醫。



常用抗癲癇藥物及副作用

- 第三類的副作用是有些藥對某些人可能破壞內臟功能，尤其是對肝臟、腎臟或骨髓的造血功能的破壞。
 - 譬如**Tridione**、**Zarontin**、**Tegretol**等，因此服用此類藥物的病人，必須定期作肝功能、腎功能或血球數的檢查，當自己發現容易疲、小便茶褐色、腳或小腿水腫或刷牙碰撞時容易出血，更應該趕快找醫師檢查。



常用抗癲癇藥物及副作用

- 其他的副作用則視不同藥物而不同，大多與劑量有關，或與高劑量長時間服用有關。
 - 如引起複視或步履不穩（運動失調），應該減量且可以復原，如果步履不穩維持長時，則可能造成小腦破壞，縱使再減量也不會復原。

Dilantin (Aleviatin) 是最常見引起步履不穩的藥物，**Dilantin (Aleviatin)** 對有些病人如果使用劑量高且服用多年，可能使齒齦肥大、體毛增多，有礙觀瞻。如果不能減量或改服他藥，可請牙醫師手術切除肥大的牙齦，平常多刷牙，保持口腔的清潔，多少有點助益。